Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Notes extraites d'un vieil herbier par M. François Crepin.

Le respectable M. Manderlier, professeur de mathématiques à l'Université de Gand, m'ayant permis de fouiller dans son herbier, dont la majeure partie des plantes ont été recueillies il y a environ trente ans, j'ai pu en extraire quelques indications concernant la flore de la province de Namur.

M. Manderlier, alors qu'il était professeur à l'Athénée de Namur (1828-1833), avait exploré avec soin les alentours de cette ville; il avait même herborisé jusqu'à Ciney et Rochefort.

Les renseignements énumérés ci-dessous, quoique étant déjà assez anciens, n'en sont pas moins précieux, puisqu'ils concernent des stations non signalées dans la *Flore de Namur,* et qu'ils engageront les amateurs du chef-lieu de la province à les confirmer par de nouvelles recherches.

Helleborus viridis L. — Bossières.

Delphinium Consolida L. — Bossières.

Aconitum Lycoctonum L. — Ciney.

Spergularia segetalis Fenzl. — Bossières.

Impatiens Noli-tangere L. — Namur, Spy.

Monotropa Hypopitys L. — Faulx.

Trifolium montanum L. — Namur.

Lathyrus Nissolia L. — Ciney.

Coronilla varia L. — Remparts de Namur. — Cette espèce a été retrouvée (1863), par M. J. Châlon, sur les remparts de l'Arsenal à Namur!

Spiraea Filipendula L. — Rochers de St-Nicolas près de Namur. — Retrouvé sur les pelouses de Grands-Malades (Namur), par M. Devos! (1863).

Plantago Coronopus L. — Namur. — N'a pas encore été retrouvé dans la province.

Veronica montana L. — Bossières.

Lathraea squamaria L. — Mazy.

Nepeta Cataria L. — Namur, Bossières.

Stachys alpina L. — Bossières.

Scutellaria minor L. — Namur.

Specularia hybrida Alph. DC. — Lives.

Scorzonera humilis L. — Namur. — Abondant à Naninne et Lustin (Devos, 1863!).

Rumex maritimus L. — Namur.

Polygonum Bistorta L. — Bossières.

Daphne Mezereum L. — Moustier.

Euphorbia Cyparissias L. — Namur.

Aristolochia Clematitis L. — Revers de chemins à Villers-sur-Lesse — J'ai retouvé cette espèce en 1860, dans les broussailles et les haies qui sont au pied du château de ce village.

Tamus communis L. — Bossières.

Galanthus nivalis L. — Prairies élevées, route de Namur à Louvain. — MM. les abbés Barbier ont observé, en 1861, cette espèce abondante dans une prairie du village de Jeneffe-en-Condroz.

Allium ursinum L. — Bossières.

Agraphis nutans Link. — Gembloux.

Orchis purpurea Huds. (O. fusca Jacq.). — Bossières.

Acorus Calamus L. — Étangs à Geronsart. — J'ai trouvé cette espèce en extrême abondance dans l'étang *des Pauches*, près de St-Remy (Rochefort).

Juncus Tenageia L. — Perelle, près de Namur.

Carex paniculata L. — Salzinne.

Scirpus pauciflorus Lightf. — Salzinne. — Cette espèce n'a pas encore été revue dans la province.

Setaria verticillata P. B. — Salzinne.

Elymus europaeus L. — Bez et derrière la vinaigrerie, près de Namur.

Le nom de Bossières, si fréquemment répété, annonce que les bords de l'Orneau ne sont pas dépourvus d'intérêt sous le rapport de la végétation, aussi j'engage fortement les amateurs de Namur à les visiter. S'il m'était permis de donner un conseil à ceux-ci, je leur recommanderais d'étendre leurs courses davantage (1). Au moyen des lignes

---

(1) Depuis que ceci est écrit, M. Devos a étendu au loin ses courses et leur résultat est déjà très-brillant.

de chemins de fer qui rayonnent autour du chef-lieu, il est aujourd'hui bien aisé d'explorer la vallée de la Sambre, l'Entre-Sambre-et-Meuse, les environs de Walcourt, de Fosses et d'Andenne, qui sont encore peu connus.

Gand, 20 mai 1863.

Étude sur quelques bouleaux de la flore belge; par M. Alfred Wesmael, directeur du Jardin botanique de Mons.

Les nombreuses et différentes formes de bouleaux qui s'observent en Belgique semblent, au moins d'après la plupart des auteurs, rentrer dans deux types spécifiques distincts : 1° le *Betula verrucosa* Ehrh.; 2° le *B. pubescens* Ehrh. A la première de ces espèces viendrait se rattacher le *B. alba* L. Cette manière de voir est partagée par MM. Koch, Grenier, Godron, etc. D'autre part, nous voyons que cette opinion est combattue par MM. Fries, Hartig, Duchartre, etc. Ces derniers auteurs basent leur manière de voir d'après l'extension géographique des deux espèces d'Ehrhart. Le bouleau verruqueux est caractéristique des parties septentrionales de l'Allemagne; on le rencontre à peu près uniquement dans les plaines; sur les montagnes, il est remplacé, à une faible altitude, par le bouleau pubescent. Il s'avance aussi moins loin dans le Nord que cette dernière espèce, au point qu'on n'en trouve que des pieds isolés et peu communs dans le sud de la Suède et de la Norwége, et qu'il manque complétement dans le nord de ces deux pays. Il est donc exact de considérer le *B. pubes-*